


MANEJO DE REPRODUCTORAS

CRIANZA DE POLLONAS EFFICIENCY PLUS

Cría exitosa = más del 80% de las hembras del lote receptivas ("maduras") al momento de la estimulación lumínica

Nota: El manejo del lote debe adaptarse de acuerdo con las condiciones locales de cría (tipo de instalación, clima, etc.).



- 1** Alimentación ad libitum: Proporcionar acceso libre al alimento durante las primeras 2 semanas y continuar hasta las 3 semanas de edad si no se alcanza el peso objetivo a las 2 semanas.
- 2** Manejo de la luz: Combinar la reducción de la duración del día y la intensidad de la luz durante las primeras 2 semanas: comenzar con 24 horas de luz a 60 lux → Reducir a 8 horas de luz a 5-10 lux.
- 3** Proporcionar 3-5 cm de espacio en perchas por ave o 1-2 m² de espacio en plataformas por cada 500 aves a partir de los 28 días para entrenarlas a subir a los nidos.
- 4** Separar a las crías más pequeñas antes de las 4 semanas y crear grupos de peso con al menos un 85% de uniformidad (CV = 7.5). Dentro de las 4 semanas posteriores a la clasificación, o a más tardar a las 8 semanas, el corral con las aves más pequeñas debe alcanzar el peso objetivo de las 8 semanas para garantizar un desarrollo óseo adecuado, que estará casi completo a esta edad.
- 5** Mantener un tiempo de alimentación de 45-60 minutos: Ajustar el programa de alimentación para lograrlo (sujeto a las normativas locales).
- 6** Evitar interrupciones en el crecimiento y la uniformidad: Especialmente entre las 18 y 22 semanas de edad. Especialmente durante los cambios de tipo de alimento y la administración de vacunas. Evaluar regularmente la conformación corporal y el nivel de grasa.
- 7** Dar la primera estimulación lumínica solo a partir de los 154 días: Si la madurez sexual es insuficiente (menos del 80% de las hembras con una apertura de los huesos pélvicos mayor a 2 dedos o 3 cm, puntuación baja de musculatura o una línea de grasa pequeña), retrasar la estimulación conforme a la Guía de Manejo Efficiency Plus.

Durante toda la vida del lote:

- ⇒ Asegurar una buena distribución tanto del alimento como del agua.
- ⇒ Mantener una buena calidad de crías.
- ⇒ Cumplir con los requisitos ambientales y de calidad del aire para garantizar la salud del lote.
- ⇒ Pesar entre el 3% y el 5% del lote, con un mínimo de 100 aves por corral cada semana.

EQUIPO Y DENSIDAD DE POBLACIÓN DURANTE CRIANZA	Densidad de población *	
	6.0 aves/m ²	
	Criadoras	1 para 500 polluelos
	Bebedero - redondo	1 para 80 aves
	Bebedero- pico	1 para 8-10 aves
	Comedero- cadena	15 cm/ave (7.5m/100 aves)
	Bandeja de alimentación - redonda	1 para 12 aves
	Bandeja de alimentación - ovalada	1 para 13-14 aves
	Alimentador a voleo	1 para 1500-1800 aves
	Tiempo de distribución de alimento	< 4 minutos

* La densidad de población puede estar sujeta a regulaciones locales que deben ser cumplidas.

i



[Póster Hubbard
Distribución
de alimento](#)



[Objetivos de Resultados
Efficiency Plus
Reproductoras](#)



[Boletín Hubbard
Clasificación de
Reproductoras](#)



[Guía de Manejo
Reproductoras
Efficiency Plus](#)