

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO CON COMEDEROS LINEALES

Garantice una distribución uniforme del alimento para mejorar la producción de huevos, la uniformidad del lote y la supervivencia de las aves

PERIODOS CRÍTICOS

- Al inicio de la puesta cuando la asignación del alimento aumento diariamente.
- Después del pico de producción, cuando la cantidad de alimento podría disminuir.

PROCEDIMIENTO

1. Asegúrese de que la profundidad del nivel de alimento sea constante en todas las líneas de comederos y que el espacio de alimentación por ave sea suficiente (15 cm por hembra para redbro y efficiency plus y de 12 a 14 cm por ave para hembras premium mini).
2. Registre el tiempo (por ejemplo: 4 minutos) que se necesita para obtener una buena distribución de alimento en todas las líneas (resulta en un buen nivel en el punto de retorno).
3. Existen dos posibles métodos para manejar adecuadamente la distribución de alimento en la última alimentación.
 - El sistema de distribución de alimentos debe vaciarse en 4 minutos (ni más, ni menos). utilice este método únicamente si hay alguien presente en la última distribución de alimento.
 - 0.5 kg de alimento debe permanecer en el sistema de distribución de alimentos después de 4 minutos (este método es conveniente cuando no hay nadie presente en la distribución de alimento).



¿CÓMO SABER SI LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTO DURANTE LA ÚLTIMA ALIMENTACIÓN SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE ?

